

Verser la quantité désirée de gel dans un récipient séparé. Jeter après usage. Plongez le bout de la bouture dans le Gel de EZ-Racine jusqu'au dessus de la coupe diagonale. Ensuite placer les boutures dans le substrat de croissance. Les temps d'enracinement peut varier selon l'espèce. Transplanter les boutures lorsqu'ils sont en raciné.

ATTENTION

Garder hors de la portée des enfants et les animaux | Eviter le contact avec la peau et les yeux | Laver les mains a l'eau après usages | Garder sous clef, dans un endroit frais et sec, hors de la lumière directe du soleil

Fabriqué par : Hicrocorp Inc., 605 Justus Dr., Kingston, Ontario, Canada K7M 4H5 613-384-8882 info@ez-gro.com
Numéro d'enregistrement 2003003A Loi sur les engrais
Numéro de lot



EZ-Root Gel contains 2 plant hormones to encourage new root development in semi-hard cuttings | Gel de EZ-Racine contient 2 hormones de plante pour aider le nouveau développement de racine dans les boutures semi-dures.

**Minimum Guaranteed Analysis (By Weight)
Analyse Minimale Garantie (Par Poids)**

Indole-3-Butyric Acid (IBA) / Acide Indole-3-Butyric (AIB).....0.50%
Naphthaleneacetic Acid (NAA) / Acide Naphthalenacetic (ANA)..0.25%

EZ-ROOT GEL / GEL DE EZ-RACINE

Pour desired amount of gel into a separate container. Discard after use. Dip the cutting into the EZ-Root Gel up to the top of the diagonal cut. Following dipping, immediately place cuttings into growing medium. Rooting times may vary depending on species. Transplant cuttings once they are rooted.

ATTENTION

Keep out of reach of children and animals | Avoid contact with skin and eyes | Wash hands after use | Store locked up, in a cool, dry area, out of direct sunlight

☐ 220 ml ☐ 1 L

Manufactured by: Hicrocorp Inc., 605 Justus Dr., Kingston, Ontario, Canada K7M 4H5 613-384-8882 info@ez-gro.com
Registration Number 2003003A Fertilizers Act
Lot Number