



GARANTI ANALYSE MINIMALE

Glycine Betaine.....	10%
Cytokinin as kinetin.....	0.10%
Salicylic acid.....	0.03%
Ascorbic acid.....	0.03%
Thiamine HCl.....	0.03%

ATTENTION

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX

Ne pas appliquer dans les 21 jours suivant la récolte | Ne pas réintégrer les zones traitées dans les 12 heures suivant l'application foliaire | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves | Peut provoquer une irritation respiratoire | Porter des gants de protection, des vêtements, une protection oculaire et respiratoire | Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit | Éviter de respirer les fumées, utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé | Se laver soigneusement après manipulation | Ne pas laisser l'eau de rinçage contaminer les ruisseaux, les étangs et les lacs, car la vie aquatique peut être en danger | Pour les utilisations terrestres, ne pas appliquer directement sur l'eau ou dans les zones où il y a de l'eau de surface ou dans les zones intertidales sous la ligne moyenne des hautes eaux | Ne pas connecter un système d'irrigation (y compris les systèmes de serre) utilisé pour l'application de pesticides au réseau public d'eau | En cas d'exposition inquiète ou de malaise, contactez un fournisseur de soins de santé | En cas d'ingestion - rincer la bouche | En cas de contact avec la peau - laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser | En cas de contact avec les yeux - rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire. Continuer le rinçage | En cas d'inhalation - transporter la personne à l'air frais et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer | Conserver sous clé, bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. | Éliminez le contenu et l'emballage conformément aux exigences locales, régionales et fédérales.

NUMÉRO DE LOT:

Fabriqué par: HigoCorp Inc., 605 Justus Dr., Kingston, Ontario K7M 4H5 | 613-384-8882
Dérivé des numéros d'enregistrement: 2017083A & 2017101A Fertilizers Act

BIO-APP™ BETAINE-K WITH OSMOPROTECTANT

Biostimulant with Abiotic Plant Protection Technology.

Contient des biostimulants et des régulateurs de croissance des plantes pour aider à améliorer les rendements des cultures et à réduire le stress environnemental. Contient des biostimulants et des régulateurs de croissance des plantes trouvés dans la nature. Stimule la croissance des semis et des plantes et peut augmenter la qualité et le rendement. Aide à réduire le choc de transplantation et augmente le poids des racines, ainsi que le nombre et la taille des fleurs. La glycine bêtaïne est un puissant osmo-protecteur contre la sécheresse.

Tableau d'application foliaire:

RECADRER	TAUX D'APPLICATION UTILISEZ ASSEZ D'EAU POUR LA COUVERTURE
Orge, avoine, seigle, blé de printemps ou d'hiver, canola, graines de lin, moutarde, carthame, tournesol et maïs	3 à 5 taux de stade foliaire 1 L / ha
Légumineuses (soja, haricots, lentilles, pois chiches, pois)	3 à 5 taux de stade foliaire 1 L / ha
Luzerne, trèfle, foin	1ère application 1L / ha au stade 3-5 feuilles. 2ème application après la coupe.
Chou frisé, chou, brocoli, chou-fleur, choux de Bruxelles	Appliquer 1 L / ha 14 à 21 jours après la levée. 2ème application à 5-10% de floraison.
Légumes-fruits (tomates, poivrons, aubergines)	Appliquer 1 L / ha 14 à 21 jours après la levée. 2ème application à 5-10% de floraison. 3e stade des petits fruits.
Concombres, pastèque, courge	Appliquer 1 L / ha 14 à 21 jours après la levée. 2ème application à 5-10% de floraison.
Légumes feuillus (laitue, céleri, épinards, bette à carde)	Appliquer 1 L / ha 14 à 21 jours après la levée. 2ème application mi-saison.
La betterave à sucre	1er: 1L / ha 14 jours après la levée. 2ème 2-3 semaines après la 1ère pendant le développement des racines.

continué sur le dos

3.2L (3.35KG)

RECADRER	TAUX D'APPLICATION UTILISEZ ASSEZ D'EAU POUR LA COUVERTURE
Pommes	1ère application rose complet 1L / ha. 2ème application pétale chute 1L / ha. 3ème application 21 jours après la chute des pétales 1L / ha. 4ème application (facultative) 50 jours après la chute des pétales 1L / ha.
Fruits à noyau (pêches, cerises, prunes, abricots)	1ère application préfloraison 1L / ha. 2ème application pétale chute 1L / ha. 3ème application 21 jours après la chute des pétales 1L / ha.
Raisins	1ère application feuillage / pré-floraison 300 ml / ha. 2ème application pétale chute 1L / ha. 3e stade des petits fruits.
Fleurs et espèces de literie	1ère application lors de la transplantation. 2ème application à 5-10% de floraison. 1,0 ml / à 1 L d'eau (1 L / ha).
Production de gazon et de gazon	Appliquer 25 ml / 100 m2 toutes les 3-4 semaines foliaires sur les verts et les tés pour une croissance plus verte et une protection contre la sécheresse.
Culture hydroponique et cannabis	Option 1: 0,5 ml / L d'eau du réservoir par semaine. Option 2: Appliquer 1 L / ha (1 ml / L d'eau) 14 à 21 jours après la levée. 2ème application à 5-10% de floraison. 3e stade des petits fruits.

20L/10ha/25acres

